

Lyme ++

Be double positive when using the new ZEUS ELISA *Borrelia* VlsE1/pepC10 IgG/IgM Test System

- Combination of VlsE1 and pepC10 antigens to test simultaneously in the same well that produces superior clinical sensitivity and specificity.¹
- Reduce lab costs for unnecessary confirmatory tests, such as Western Blot.
- Capable of being run in a manual, semi-automated, or fully automated capacity.

Test with confidence.

¹ R.M. Bacon et al. Improved Serological Testing for Lyme Disease. JID 2003; 187:1187-1199



Lyme ++ Test

Borrelia burgdorferi /spirochetal bacteriën.

De kwaliteit van menig Lyme test staat ter discussie. Kwaliteit en per land verschillende factoren kunnen het uiteindelijk resultaat beïnvloeden. Juist hierom hebben wij de mogelijkheid om deze test voor een zeer lage prijs uit te testen!

Test met vertrouwen

De ziekte van Lyme is de meest voorkomende door Teken overgedragen ziekte in het noordelijk halfrond en wordt veroorzaakt door infectie met *Borrelia burgdorferi*, een spirochetal bacteriën. Ziekte van Lyme kent verschillende fasen, vaak met tussenliggende latente perioden en met verschillende klinische manifestaties. Vroege diagnose van ziekte van

Lyme en daaropvolgende behandeling met antibiotica, meestal infectie elimineren en symptomen. echter, vertraagde of onvoldoende behandeling kan leiden tot meer ernstige symptomen zoals hartafwijkingen, artritis of CNS syndromen.

ZEUS ELISA™

De laatste jaren ontwikkelingen in de identificatie van antigenen te helpen bij de diagnose van Lyme-borreliose heeft geleid tot de

gebruik van antigenen die verhoogde klinische gevoeligheid en specificiteit. Met behulp van een combinatie van VlsE1 en pepC10 antigenen, de ZEUS *Borrelia* VlsE1/pepC10 IgG / IgM ELISA biedt laboratoria een polyvalent